

この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## かぜの漢方製剤

# 葛根湯エキス顆粒DS

第2類医薬品

「葛根湯」は、漢方の古典「傷寒論」などに収載されている7種類の生薬からなる漢方製剤です。葛根湯エキス顆粒DSは、「葛根湯」のエキスを服用しやすい顆粒剤にしたもので、感冒の初期や鼻かぜ、肩こりなどに効果を発揮します。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝 機 能 障 害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください






## 効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

(裏面もお読みください。)

## 用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。なるべく温湯で服用してください。

| 年齢        | 1回量  | 1日服用回数 |
|-----------|--|--------|
| 成人（15才以上） | 1包    | 3回     |
| 7才以上15才未満 | 2/3包  |        |
| 4才以上 7才未満 | 1/2包  |        |
| 2才以上 4才未満 | 1/3包  |        |
| 2才未満      | 1/4包  |        |

- 食前とは、食事の1時間から30分位前のことです。
- 食間とは、食事のあと、2時間位たったときのことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分・分量 3包(成人1日量)中 (1包:1.2g)

葛根湯エキス(1/2量)..... 1604mg

|        |      |       |      |      |      |       |
|--------|------|-------|------|------|------|-------|
| カッコン   | 2.0g | マオウ   | 1.5g | タイソウ | 1.5g | }より抽出 |
| ケイヒ    | 1.0g | シャクヤク | 1.0g | カンゾウ | 1.0g |       |
| ショウキョウ | 0.5g |       |      |      |      |       |

添加物としてトウモロコシデンプン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスボドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含有します。

**養生訓** かぜを早く治すコツは、早めにクスリを飲んで、休養、保温に心掛け、栄養のある食事をとりましょう。


**休養**：無理をせず身体を休め、十分に睡眠をとりましょう。

体力の回復とともにかぜの治りを助けます。

**保温**：保温をして血液循環をよくしましょう。

**温度・湿度**：室内の適切な温度と湿度を保ちましょう。

**栄養**：食事はビタミン、カロリーに富んだ消化のよいもの、あたたかいものを取りましょう。水分も十分補給しましょう。



発熱時はビタミンを多量に消耗します。



かぜウイルスに負けない体力が必要です。



汗をかいたら水分の補給が大切です。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を2回しっかり折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)本品は大変吸湿しやすいので、分割して服用した後、袋の口をしっかりと折り返していなかったり、開封したままで放置したりすると、変色したり固まったりすることがあります。変色したり固まったりした場合には服用しないでください。
- (6)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

## お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055

午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元 **白石薬品株式会社**  
大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**  
富山市草島15-1