

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。
- (4) 衣服などに付着した場合、水か洗剤でなるべく早く洗い落としてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 冬季など気温の低い時に、中身の粘度が高くなり噴射しにくくなる場合がありますが手の中で少し温めてからお使いください。
- (7) ノズルの先端を針などで突くと折れた時に大変危険なので、絶対にしないでください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先  
昭和製薬株式会社  
製造管理係 TEL 06-6996-5111



発売元  
白石薬品株式会社  
大阪府茨木市五日市1-10-33  
製造販売元  
昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

# のど

## はれ・荒れに のどの痛みと



# エスベタン のどスプレー

25mL

第3類医薬品

## 【効能・効果】

のどの炎症によるのどあれ・  
のどの痛み・のどのはれ・の  
どの不快感・声がれ

## 【用法・用量】

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

## 【用法・用量に関連する注意】

- (1) ノズルをのどの患部にむけて、アーンと声を出しながら2~3回直射してください。
- (2) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (5) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 【成分・分量】(1mL中)

ポピドンヨード……4.5mg  
(有効ヨウ素として0.45mg)含有  
添加物……グリセリン、エタノール、プロピレングリコール、  
ヨウ化カリウム、l-メントール

## 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

副作用救済制度

☎0120-149-931

## △【使用上の注意】

### ⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないでください。

### ■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(2) 授乳中の人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 次の症状のある人 口内のひどいただれ  
(5) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。